

豊見城市新型コロナウイルスワクチン接種について

ワクチン接種順位

1 高齢者（7月中に接種完了予定）

▶令和3年度中に65歳以上に達する方

※高齢者付き添いの方に対しワクチン接種を行います。（先着12人/1日 ※要事前予約）▶▶▶



2 基礎疾患を有する者（基礎疾患を有する方は、市ホームページをご覧ください）▶▶▶

1. 令和3年度中に65歳に達しない者であって、以下の病気や状態の方で、通院または入院している者

▶慢性の呼吸器の病気 ▶慢性の心臓病(高血圧を含む) ▶慢性の腎臓病 ▶慢性の肝臓病(肝硬変等)

▶インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病

▶血液の病気(ただし鉄欠乏性貧血を除く)

▶免疫の機能が低下する病気(治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む)

▶ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている ▶免疫異常に伴う神経疾患や神経筋疾患

▶神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等) ▶染色体異常

▶重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態) ▶睡眠時無呼吸症候群

▶重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、または自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障害(療育手帳を所持している場合)

2. 基準(BMI30以上)を満たす肥満の方

3 日常生活における、必要不可欠な仕事を担う職種に従事する者

▶介護施設従事者 ▶障害者および障害児施設従事者 ▶保育施設従事者 ▶学童施設従事者 ▶市内小中学校教員等

4 上記以外(12歳~64歳)の方

副反応について 沖縄県新型コロナウイルスワクチン専門相談コールセンター ☎894-4856

主な副反応は、接種後に注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱等がみられることがあります。こうした症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。また、稀にアナフィラキシー（急性のアレルギー反応）が発生したことが報告されています。本ワクチンは新しいワクチンのため、右表以外の症状も出る可能性がありますので、接種後、体調に異変を感じた場合は、医療機関等にご相談ください。

発現割合	症 状
	コナチエ(ファイザー社)
50%以上	接種部位の痛み、疲労、頭痛
10~50%	筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、接種部位の腫れ
1~10%	吐き気、嘔吐

■コナチエ添付文書、COVID-19 ワクチンモデルナ添付文書より

ワクチン受けるにはご本人の同意が必要です



新型コロナウイルスのワクチン接種は推奨されていますが強制ではありません。どのようなワクチンでも副反応により治療が必要となる場合や、障害が残る可能性は否定できません。ワクチン接種を受ける際には、予防接種の効果と副反応リスクの両方をよく理解した上で、ご自身の意思で接種に同意する必要があります。職場や周囲の方から直接・間接的に強要されて接種することのないようご注意ください。また、現在、病気療養中の方や、体調面において接種に不安がある方は、かかりつけ医とご相談ください。

64歳以下の皆さまへ

64歳以下の皆さまへは、高齢者(65歳以上の方)のワクチン接種が終わり次第、順次ご案内いたします。また、接種状況等の詳細は市ホームページや市公式LINE等で随時お知らせいたしますので、ご確認ください。

豊見城市公式LINE登録おねがいします

タイムラインやトークにて新型コロナウイルスワクチン接種に関する最新情報などもお届けします

豊見城市ホームページより情報発信しています

豊見城市ホームページにて新型コロナウイルスワクチン接種に関する最新情報をご覧ください

